RADETZKY

Räumt auf mit Nematoden

Ölrettich

Profil

- Anfälligkeit für Rübennematoden: BSA-Note 2
- Resistenz gegen Meloidogyne chitwoodi (NL)
- Geringe Blühneigung: BSA-Note 3

Allgemein

Gründüngung	✓
Sommer-Zwischenfrucht	✓

Agronomische Eigenschaften

Massebildung im Anfang	4	gering bis mittel

Neigung zu

Blühen	3	gering
Lager	2	sehr gering bis gering

Anfälligkeiten

Rübennematoden 2 sehr gering bis gering

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2023 und eigenen Ergebnissen.

Besondere Eigenschaften

Nematodenresistenznote 2, Resistenz gegen Meloidogyne chitwoodi

Aussaat

20-25 kg/ha

Aussaattermin

Mitte Juli bis Anfang September

Nutzung

Gründüngung

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2021, Änderungen vorbehalten.