AKVITAN ÖKO

Der Praktikerweizen

A-Sommerweizen Öko

Profil

Der Sommerweizen AKVITAN verbindet ein frühes Ährenschieben mit sehr hohen und stabilen Erträgen über alle Regionen in Deutschland. Komplettiert wird das Profil mit einer sehr abgerundeten Resistenzausstattung sowie der hohen und somit sicheren Tausendkornmasse. Zusätzlich besitzt AKVITAN eine ausgezeichnete Wechselweizeneignung.

- TOP Ertragsergebnisse bei Frühjahrs- und später Herbstaussaat
- Frühere Reife
- Gehobene A-Qualität
- Ausgewogene Blattgesundheit
- Einzigartig hohe TKM
- Sehr gute Kornausbildung auch unter Stressbedingungen
- Standfest

Allgemein

Qualitätsgruppe	A
Typ	Einzelährentyp
Produktionsziel	Stabile Kornerträge mit einzigartig hoher TKM, gehobener A-Vermarktungsqualität und der Eignung als Wechselweizen.
Standort	Für alle Standorte geeignet.

Agronomische Eigenschaften

Ährenschieben	4	früh bis mittel
Reife	5	mittel
Pflanzenlänge	5	mittel

Neigung zu

Lager	4	gering bis mittel

Ertragseigenschaften

Bestandesdichte	4	niedrig bis mittel
Kornzahl / Ähre	4	niedrig bis mittel
Tausendkornmasse	9	sehr hoch
Kornertrag Stufe 1	6	mittel bis hoch

Qualität

Qualitätsgruppe	A	
Fallzahlstabilität	0	
Fallzahl	6	mittel bis hoch
Rohproteingehalt	6	mittel bis hoch
Sedimentationswert	9	sehr hoch
Griffigkeit	9	sehr hoch
Wasseraufnahme	7	hoch
Mineralstoffwertzahl	5	mittel
Mehlausbeute T 550	5	mittel
Volumenausbeute	7	hoch
Elastizität des Teiges - überwiegende Eigenschaft	3	kurz
Oberflächenbeschaffenheit des Teiges	3	trocken
Hektolitergewicht	5	mittel

Anfälligkeiten

Mehltau	5	mittel
Gelbrost	5	mittel
Braunrost	4	gering bis mittel
Ährenfusarium	5	mittel
Blattseptoria	5	mittel

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2022 und eigenen Ergebnissen.

Eignung

Stoppelweizen	+ +
Maisvorfrucht	+ +
Mulchsaat	+ +
Spätsaat	+ +
Schwache Standorte	+ + +
Ökoeignung	+ + +

Spätsaat *: ab 20. November, auf Standorten mit frühem Vegetationsende ab. 10. November

Geeignet als Vorfrucht für

Mais	✓
Raps	✓
Rüben	✓
Weizen	✓

Produktionsziel

Stabile Kornerträge mit einzigartig hoher TKM, gehobener A-Vermarktungsqualität und der Eignung als Wechselweizen.

Sortentyp

Einzelährentyp mit geringer bis mittlerer Kornzahl/Ähre und Bestandesdichte und sehr hoher TKM. Sommerweizen mit guter Wechselweizeneignung.

Saatzeit / Saatstärke

Herbstaussaat:
ab 20. November, auf Standorten mit frühem Vegetationsende ab. 10. Nov.

Frühjahrsaussaat:
so früh wie möglich (Februar/März) 360-450 Körner/m^2

Geringere Saatstärken bei günstigen Bodenbedingungen und frühen Saatterminen im Herbst und Frühjahr. Höhere Saatstärken bei ungünstigen Standortbedingungen, Tonböden und späten Saatterminen im Herbst oder Frühjahr.

Bestandesdichte

Niedrige Ertragserwartung: 400-430 Ähren/m^2
Mittlere Ertragserwartung: 430-520 Ähren/m^2
Hohe Ertragserwartung: 500-600 Ähren/m^2

Wachstumsregler

Gute Standfestigkeit, deshalb geringer WR-Bedarf.

***Beispiel*: hohe Ertragserwartung/ausreichende Wasserversorgung**
EC 25 0,5 – 0,9 l/ha CCC
EC 29 0,2 - 0,4 l/ha CCC

***Beispiel*: geringe bis mittlere Ertragserwartung/oft schlechte Wasserversorgung**
EC 25-29 0,5-1,0 l/ha CCC

WR-Einsatz an Bestandesentwicklung, Standort, Ertragspotenzial und Witterung anpassen.

Herbizide / Fungizide

Sehr gute Blattgesundheit, geringe Pflanzenschutzintensität notwendig. Je nach Auftreten der Krankheiten, sehr gutes Resistenzpaket gegen alle Krankheiten. Gute bis mittlere Ährengesundheit (gute APS 5). Bei Mulchsaat nach Mais Abschlussbehandlung zur Blüte auf Fusarium ausrichten.

Düngung

Die Gaben sollten an Standort, Bestandesentwicklung und Ertragsziel angepasst werden. Bei Frühjahrsaussaat 1. Gabe zur Saat. Ausreichende N-Spätdüngung zur Absicherung des Proteingehalts.

Öko-Zertifikat

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 04/2024, Änderungen vorbehalten.