



TERRALIFE® - HUMUSPLUS 1.2

Untersaaten & Begrünung

Robust und genügsam

Ehemals Humus-Plus-VORSAAT

Profil

Diese Mischung eignet sich als Untersaat im Mais, da sie eine gute Narbe bilden kann und trotzdem den Mais nicht im Wachstum behindert. In der Jugend ist die Entwicklung dieser Untersaat eher langsam und der Aufwuchs ist nicht zu stark. Weder bei trockenen noch bei nassen Bedingungen wird der Mais negativ beeinflusst, gerade bei trockener Witterung bildet sich eine wassersparende Bodenbedeckung, die vor Verdunstung schützt. Selbst im Herbst ist der Bestand nicht zu mastig, so dass bei einer Behandlung der Maisstoppeln keine zusätzliche Energie verbraucht wird. Obwohl Rot- und Schafschwingel absolut winterfest sind, gibt es im Frühling keine Probleme bei der Zerkleinerung und Einarbeitung des Aufwuchses. Vor Zerkleinerung und Einarbeitung muss die Untersaat abgespritzt werden. Durch die große Wurzelmasse des Rotschwingels kann die Tragfähigkeit des Bodens verbessert werden und der Boden wird mit organischer Substanz angereichert.

- ✓ Aussaat direkt vor oder nach dem Maislegen
- ✓ Bodenbedeckung & Erosionsschutz

Leguminosenfrei

Zusammensetzung

Härtlicher Schwingel

Rotschwingel (horstbildend)

Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streuereinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Streusaat, Drohne

Weitere Informationen

Aussaattermin

direkt vor bzw. nach der Maisaussaat

Fruchtfolgen

Getreide, Mais

Anbauhinweise

Aussaatzstärke	7 - 10 kg/ha	als Breitsaat
Neuansaat		
Nachsaat		
Durchsaat		
Übersaat		
Untersaat		
Frühjahr		
Sommer		
Nutzungen pro Jahr		
Nutzung	Untersaat, Untersaatmischung für Mais, Grünbrachemischung, winterhart, leguminosenfrei	

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2021, Änderungen vorbehalten.