



## ROSSIMONTE

### DEUTSCHES WEIDELGRAS

#### Profil

ROSSIMONTE ist ein sehr interessantes diploides Deutsches Weidelgras aus der späten Reifegruppe. Auf der niederländischen Empfehlungsliste zeigt ROSSIMONTE vor allem im zweiten Schnitt einen hohen Trockenmasseertrag und ist sowohl für Schnitt- als auch für Weidenutzung geeignet. Der Vorteil des sehr späten Ährenschiebens ist, dass die Beweidungszeit extrem lang ist. Dadurch kann viel Gras unter Beweidung genutzt werden, bevor die Ähren erscheinen und die Futterqualität abnimmt. Darüber hinaus hat ROSSIMONTE in verschiedenen Versuchen eine erhöhte Zellwandverdaulichkeit im Vergleich zu anderen Sorten des späten, diploiden Segements gezeigt, und hat daher die Milk Index Auszeichnung erhalten.

**Internationale Listungen/Empfehlungen:** BE, DE, NL

**Aussaatstärke:** 40 kg/ha

- ✓ Überdurchschnittliche Zellwandverdaulichkeit
- ✓ Hohe Erträge bei Schnitt- und Weidenutzung
- ✓ Sehr gute Standfestigkeit
- ✓ Gute Audauer und Narbendichte



#### Eignung

Ploidie	diploid
Reife	spät

## Agronomische Eigenschaften

Massebildung im Anfang	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	gering bis mittel
Neigung zu		
Auswinterung	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel
Lager	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel bis stark
Blütenstandsbildung im Nachwuchs	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	gering

## Ertragseigenschaften

Ausdauer	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel bis hoch
Narbendichte	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel bis dicht
TM-Ertrag Gesamt	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel bis hoch
TM-Ertrag - 1. Schnitt	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel bis hoch
TM-Ertrag - weitere Schnitte	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel bis hoch

## Anfälligkeiten

Rost	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel
------	---	--------

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2024 und eigenen Ergebnissen.

## Regionalempfehlung

	Ackerfutter	Grünland
Nord-Ost		✓
Nord-West		✓

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2021, Änderungen vorbehalten.

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2024, Änderungen vorbehalten.