



CLOONEY

S 250 | K 240

Eine oscarreife Vorstellung

Profil






Allrounder für Silo, Biogas und Korn

CLOONEY kann im mittelfrühen Reifebereich für alle Optionen genutzt werden: als Silo-, Biogas- und Körnermais. In Bayern überzeugte die Sorte in der Biogasausbeute und sicherte sich hier den Spitzenplatz. Die langwüchsige Sorte überzeugt durch sehr hohe Gesamttrockenmasseerträge. In Kombination mit einem hohen Kolbenanteil wird eine hervorragende Silagequalität sichergestellt. Das Korn ist ein typisches Hartmaiskorn. Dadurch ist CLOONEY als Körnermais auch sehr gut für die Trockenmüllerei nutzbar.

- ✓ Dreifachnutzer für Silo, Korn und Energie
- ✓ Hartmaisbetonte Hybride
- ✓ Hoher Biogasertrag



Allgemein

Nutzung	   
Siloreife	mittelfrüh
Körnerreife	mittelfrüh
Siloreifezahl	250
Körnerreifezahl	240
Korntyp	Ha / Hartmais
Hybridform	Dreiweghybride
Aussaattermin	

Agronomische Eigenschaften

Zeitpunkt, weibliche Blüte	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel bis spät
Pflanzenlänge	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	lang bis sehr lang
Kälteempfindlichkeit in der Jugend	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	gering bis mittel
Abreifegrad der Blätter	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	mittel

Neigung zu

Bestockung	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	sehr gering bis gering
Lager (Silonutzung)	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	gering bis mittel
Lager (Körnernutzung)	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	gering bis mittel

Ertragseigenschaften

Gesamt-trockenmasse	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	hoch
Energieertrag	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>(8)</div><div>9</div></div>	(stark bis sehr stark)
Stärkegehalt	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	niedrig bis mittel
Verdaulichkeit	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	niedrig bis mittel
Biogasausbeute	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	mittel bis hoch
Biogasertrag	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	stark bis sehr stark
Kornertrag	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>	hoch bis sehr hoch

Anfälligkeiten

Stängelfäule	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	gering
--------------	---	--------

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2024 und eigenen Ergebnissen. | () = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung:
+++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

Resistenzen gegenüber Krankheiten

Beulenbrand	  
<i>Helminthosporium tritici-repentis</i> = DTR <i>Drechslera tritici-repentis</i>	  

Standort

The figure consists of two horizontal bar charts. The top chart, labeled 'Bodenart', shows a distribution of soil types. The x-axis is labeled 'schwer' (heavy) on the left and 'leicht' (light) on the right. The bar is dark green, with a lighter green segment at the right end. The bottom chart, labeled 'Feuchtigkeit', shows a distribution of moisture levels. The x-axis is labeled 'feucht' (moist) on the left and 'trocken' (dry) on the right. The bar is dark green, with a lighter green segment at the right end. Both charts have a vertical line at the center of the x-axis.

Aussaat

Silomais	8 - 10 Pfl./m ²
Körnermais	7 - 9 Pfl./m ²

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.